


Brevet des collèges Pondichéry juin 2018

EXERCICE 1 : 13 Points

On considère un jeu composé d'un plateau tournant et d'une boule.

Représenté ci-dessous, ce plateau comporte 13 cases numérotées de 0 à 12.



On lance la boule sur le plateau.

La boule finit par s'arrêter au hasard sur une case numérotée.

La boule a la même probabilité de s'arrêter sur chaque case

Question 1 : Quelle est la probabilité que la boule s'arrête sur la case numérotée 8?

Réponse :

Question 2 : Quelle est la probabilité que le numéro de la case sur lequel la boule s'arrête soit un nombre impair?

Réponse :

Question 3 : Quelle est la probabilité que le numéro de la case sur laquelle la boule s'arrête soit un nombre premier?

Réponse :

Question 4 : Lors des deux derniers lancers, la boule s'est arrêtée à chaque fois sur la case numérotée 9.

A-t-on maintenant plus de chances que la boule s'arrête sur la case numérotée 9 plutôt que sur la case numérotée 7?

Argumenter à l'aide d'un calcul de probabilités.

Réponse :

EXERCICE 2 : 9 POINTS

Le pavage représenté sur la figure 1 est réalisé à partir d'un motif appelé pied-de-coq qui est présent sur de nombreux tissus utilisés pour la fabrication de vêtements. Le motif pied-de-coq est représenté par le polygone ci-dessous à droite (figure 2) qui peut être réalisé à l'aide d'un quadrillage régulier.




Figure 1




Figure 2

Question 1 : Sur la figure 1, quel type de transformation géométrique permet d'obtenir le motif 2 à partir du motif 1?

Réponse :

Question 2 : Dans cette question, on considère que :

$AB = 1 \text{ cm}$ (figure 2).

Déterminer l'aire d'un motif pied-de-coq.

Réponse :

Question 3 : Marie affirme « si je divise par 2 les longueurs d'un motif, son aire sera aussi divisée par 2 ».

A-t-elle raison? Expliquer pourquoi.

Réponse :

EXERCICE 3 : 9 Points

Cet exercice est un Q. C. M. (Questionnaire à choix multiples).

Pour chacune des questions, quatre réponses sont proposées et une seule est exacte. Une réponse fausse ou absente n'enlève pas de point.

Question 1 : $2,53 \times 10^{15} =$

Réponse a : 2,530 000 000 000 000 00

Réponse b : 2530 000 000 000 000

Réponse c : 253 000 000 000 000 000

Réponse d : 37,95

Réponse exacte :

Question 2 : La latitude de l'équateur est :

Réponse a : 0°

Réponse b : 90° Est

Réponse c : 90° Nord

Réponse d : 90° Sud

Réponse exacte :

Question 4 : $\frac{\frac{2}{3} + \frac{5}{6}}{7} =$

Réponse a : $\frac{3}{14}$

Réponse b : $\frac{1}{9}$

Réponse c : 0,214 285 714

Réponse d : 0,111 111 111

Réponse exacte :

EXERCICE 4 : 18 Points

Programme A

Choisir un nombre

Soustraire 3

Calculer le carré du résultat obtenu

Programme B

Choisir un nombre

Calculer le caré de ce nombre

Ajouter le triple du nombre de départ

Ajouter 7

Question 1 : Corinne choisit le nombre 1 et applique le programme A.

Expliquer en détaillant les calculs que le résultat du programme de calcul est 4.

Réponse :

Question 2 : Tidjane choisit le nombre -5 et applique le programme B.

Quel résultat obtient-il?

Réponse :

Question 3 : Lina souhaite regrouper le résultat de chaque programme à l'aide d'un tableur. Elle crée la feuille de calcul ci-dessous. Quelle formule, copiée ensuite à droite dans les cellules C3 à H3, a-t-elle saisie dans la cellule B3?

B2		=(B1-3) ^ r 2						
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Nombre de départ	-3	-2	-1	0	1	2	3
2	Résultat du programme A	36	25	16	9	4	1	0
3	Résultat du programme B	7	5	5	7	11	17	25

Réponse :

Question 4 : Zoé cherche à trouver un nombre de départ pour lequel les deux programmes de calcul donnent le même résultat.

Pour cela, elle appelle x le nombre choisi au départ et exprime le résultat de chaque programme de calcul en fonction de x .

a. Montrer que le résultat du programme A en fonction de x peut s'écrire sous forme développée et réduite : $x^2 - 6x + 9$

Réponse :

b. Écrire le résultat du programme B.


Réponse :

c. Existe-t-il un nombre de départ pour lequel les deux programmes donnent le même résultat? Si oui, lequel?

Réponse :

EXERCICE 5 : 20 Points

Dans tout l'exercice l'unité de longueur est le mm. On lance une fléchette sur une plaque carrée sur laquelle figure une cible circulaire (en gris sur la figure)



Si la pointe de la fléchette est sur le bord de la cible, on considère que la cible n'est pas atteinte.

On considère que cette expérience est aléatoire et l'on s'intéresse à la probabilité que la fléchette atteigne la cible.

— La longueur du côté de la plaque carrée est 200.

— Le rayon de la cible est 100.

— La fléchette est représentée par le point F de coordonnées $(x ; y)$ où x et y sont des nombres aléatoires compris entre -100 et 100.

Question 1 Dans l'exemple ci-dessus, la fléchette F est située au point de coordonnées (72; 54).


Montrer que la distance OF, entre la fléchette et l'origine du repère est 90.

Réponse :

Question 2 : D'une façon générale, quel nombre ne doit pas dépasser la distance OF pour que la fléchette atteigne la cible?

Réponse :

Question 3 : On réalise un programme qui simule plusieurs fois le lancer de cette fléchette sur la plaque carrée et qui compte le nombre de lancers atteignant la cible. Le programmeur a créé trois variables nommées : **carré de OF, distance et score**.



a : Lorsqu'on exécute ce programme, combien de lancers sont simulés ?

Réponse :

b : Quel est le rôle de la variable **score** ?

Réponse :

c : Compléter et recopier sur la copie uniquement les lignes 5, 6 et 7 du programme afin qu'il fonctionne correctement.

Réponse :

d : Après une exécution du programme, la variable **score** est égale à 102.


À quelle fréquence la cible a-t-elle été atteinte dans cette simulation?

Exprimer le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

Réponse :

EXERCICE 6 : 15 points

Chris fait une course à vélo tout terrain (VTT). Le graphique ci-dessous représente sa fréquence cardiaque (en battements par minute) en fonction du temps lors de la course.



Question 1 : Quelle est la fréquence cardiaque de Chris au départ de sa course?

Réponse :

Question 2 : Quel est le maximum de la fréquence cardiaque atteinte par Chris au cours de sa course?

Réponse :

Question 3 : Chris est parti à 9 h 33 de chez lui et termine sa course à 10 h 26.

Quelle a été la durée, en minutes de sa course?

Réponse :

Question 4 : Chris a parcouru 11 km lors de cette course.

Montrer que sa vitesse moyenne est d'environ 12,5 km/h.

Réponse :

Question 5 : On appelle FCM (Fréquence Cardiaque Maximale) la fréquence maximale que peut supporter l'organisme.

Celle de Chris est $FCM = 190$ battements par minute.

En effectuant des recherches sur des sites internet spécialisés, il a trouvé les données suivantes :

Effort : léger

Fréquence cardiaque mesurée : Inférieure à 70% de la FCM

Effort : soutenu

Fréquence cardiaque mesurée : 70% à 85% de la FCM

Effort : tempo

Fréquence cardiaque mesurée : 85% à 92% de la FCM


Effort : seuil anaérobie

Fréquence cardiaque mesurée : 92% à 97% de la FCM

Estimer la durée de la période pendant laquelle Chris a fourni un effort soutenu au cours de sa course.

Réponse :

EXERCICE 7 : 16 Points



On considère ci-dessus un triangle ABC rectangle en A tel que

$\widehat{ABC} = 30^\circ$ et $AB = 7$ cm.

H est le pied de la hauteur issue de A.

Question 1 : Tracer la figure en vraie grandeur sur la copie. Laisser les traits de construction apparents sur la copie.

Réponse : (construction GeoGebra)

Question 2 : Démontrer que $AH = 3,5 \text{ cm}$.

Réponse :

Question 3 : Démontrer que les triangles ABC et HAC sont semblables.

Réponse :

Question 4 : Déterminer le coefficient de réduction permettant de passer du triangle ABC au triangle HAC

Réponse :